



PROTOCOLE DE MISE EN PLACE DES PELOUSES FLEURIES

Conditions de stockage des semences

- ⊗ Les semences doivent être stockées dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et des rongeurs.
- ⊗ Conservées dans ces conditions, la qualité des mélanges ne sera pas altérée

Préparation du sol

- ⊗ Travailler sur un sol propre, ou
- ⊗ Faire un désherbage chimique ou manuel
- ⊗ Attendre une huitaine de jours
- ⊗ Préparer le sol sur une profondeur de 15 cm à 20 cm
- ⊗ Modeler le terrain
- ⊗ Dans le cas où des levées d'adventices (mauvaises herbes) est à craindre, la pratique du faux semis est conseillée.

Technique du faux semis

- ⊗ Préparer le sol définitivement comme pour effectuer un semis
- ⊗ Laisser germer, voire faciliter la germination ou le redémarrage des adventices en arrosant
- ⊗ Attendre 3 à 6 semaines
- ⊗ Faire un désherbage chimique, thermique ou manuel, attendre 8 jours et effectuer le semis si possible sans retoucher le sol et rouler
- ⊗ Dans le cas où le sol s'est enduré en surface, se limiter à un travail du sol très superficiel de 1 à 2 cm de profondeur de façon à ne pas remettre d'autres graines d'adventices en position de germination

Semis

- ⊗ Semer régulièrement sur toute la surface à la dose de semis préconisée par 2 passages croisés, compte tenu de la faible dose de semis, la dilution avec un support neutre est recommandé (sable, semoule de blé dur, terreau etc....)
- ⊗ Ratisser légèrement en surface et rouler de façon à assurer le contact terre/graines
- ⊗ Pour faciliter la germination, arroser en pluie fine (environ 5 mm par jour, juste pour mouiller le sol et maintenir l'humidité en surface) sans provoquer de ruissellement, jusqu'à la levée

Période de semis conseillée :

Printemps : 15 mars – 30 avril (mais si vous avez la possibilité d'arroser, la période peut s'étendre jusqu'au fin mai)

Automne : 1er septembre – fin octobre (à moduler en fonction des régions)

Entretien

- ⊗ Laisser monter en graines et mûrir de façon à assurer le ressemis
- ⊗ Un fauchage dans l'été est conseillé dès que l'aspect de la pelouse fleurie est moins sympathique
En cas de développement important de la végétation, un 2^{ème} fauchage peut être réalisé à l'entrée ou à la sortie de l'hiver, avant le départ de végétation

Période de fauchage conseillée : début août

Période d'observation

- ⊗ Pour un semis de printemps, contenant des vivaces, il est préférable d'attendre une année pour obtenir le rendu « définitif » du mélange grainier appliqué, le couvert végétal pouvant encore évoluer légèrement pendant une année.
- ⊗ Pour un semis d'automne, vous obtiendrez une floraison riche dès le printemps suivant

